

Vacunas

El nuevo calendario de vacunaciones sistemáticas recomendado en la Comunidad de Madrid entrará en vigor el 5 de febrero de 2004. Es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, y se utilizará en todos los centros y servicios sanitarios públicos y privados ubicados en la misma.

R.Nacido

•

•

•

•

•

Hepatitis B infantil (*)

2 meses

DTP (Difteria-Tétanos- Pertussis)

Hib (Haemophilus influenzae)

Vac.

antipoliomelítica inactivada trivalente

Meningococo C

•

Hepatitis B infantil

4 meses

DTP (Difteria-Tétanos- Pertussis)

Hib (Haemophilus influenzae)

Vac. antipoliomelítica inactivada trivalente

Meningococo C

•

•

6 meses

DTP (Difteria-Tétanos- Pertussis)

Hib (Haemophilus influenzae)

Vac. antipoliomelítica inactivada trivalente

Meningococo C

•

Hepatitis B infantil

15 meses

•

•

•

•

TV (Triple vírica)

Sarampión-

Paperas-

Rubéola (**)

•

18 meses

DTP (Difteria-Tétanos- Pertussis)

Hib (Haemophilus influenzae)

Vac. antipoliomelítica inactivada trivalente

Â
Â
Â

4 años

DTPa (Difteria-Tétanos infantil)

Â
Â
Â

TV (Triple vírica)

Sarampión-

Paperas-

Rubéola)

Â

11 años

Â
Â
Â

TV (Triple vírica)

Sarampión-

Paperas-

Rubéola)

Hepatitis B infantil (***)

14 años

Td (Difteria-Tétanos adultos)

Â

* Esquema vacunal para los niños nacidos de madres HBsAg negativo. En hijos de madre portadora de HB-sAg se administrará la pauta 0-1-6 más gammaglobulina y, en caso de "screening" no realizado la de 0-1-6 sin gammaglobulina

** En niños en riesgo, se puede adelantar a los 12 meses.

*** Para no vacunado previamente, tres dosis de Hepatitis B con pauta 0-1-6 meses. Actualmente no es necesaria la revacunación en población inmunocompetente, si se han recibido tres dosis de Hepatitis B, ni realizar anticuerpos postvacunales.

Abreviaturas:

â€” HB: Vacuna tipo infantil frente a la hepatitis B.

â€” DTP: Vacuna frente a la difteria-tétanos-petúrrsis.

â€” DTPa: Vacuna frente a la difteria-tétanos-petúrrsis acelular.

- â€” VPI: Vacuna antipoliomielÃ­tica inactiva trivalente.
- â€” Hib: Vacuna frente al Haemophilus influenzae tipo b.
- â€” Meningococo C: Vacuna conjugada frente Neisseria meningitidis serogrupo C.
- â€” TV: Vacuna triple vÃ­rica (sarampiÃ³n-paperas-rubeola).
- â€” Td: Vacuna tipo adulto frente a tÃ©tanos-difteria.

Este calendario estÃ¡ dirigido a todos los niÃ±os y niÃ±as de cero a catorce aÃ±os residentes en esta Comunidad, e incluirÃ¡ los siguientes antÃ­genos:

- â€” Hepatitis B (HB).
- â€” Neisseria meningitidis serogrupo C (Meningococo C).
- â€” Difteria (infantil D y adultos d).
- â€” TÃ©tanos (T).
- â€” Tos ferina (P = Pertussis y Pa = Pertussis acelular).
- â€” Poliomieltis (VPI = antipoliomielÃ­tica inactivada trivalente).
- â€” Haemophilus influenzae tipo b (Hib).
- â€” SarampiÃ³n-paperas-rubeola (TV = triple vÃ­rica).

La administraciÃ³n de las dosis vacunales entre cero y catorce aÃ±os se realizarÃ¡ en las edades siguientes:

- â€” Recien nacido: Se administrarÃ¡ la primera dosis de hepatitis B, antes del alta hospitalaria.

En los casos de recién nacidos hijos de madre portadora de HBsAg (antígeno de superficie del virus hepatitis B), se administrará la primera dosis de vacuna frente a la hepatitis B acompañada de una dosis de inmunoglobulina específica en las primeras doce horas de vida, la segunda dosis de vacuna al mes de la primera y la tercera a los seis meses de la primera (pauta cero, uno y seis meses).

En los casos de recién nacidos de madres a las que no se les haya realizado "screening prenatal", se administrará la vacuna hepatitis B, sin gammaglobulina, con la pauta cero, uno y seis meses.

â€” Dos meses de edad: La segunda dosis de hepatitis B, la primera dosis de vacuna conjugada frente a Neisseria meningitidis serogrupo C y la primera dosis de difteria-tÃ©tanos-pertussis-Haemophilus influenzae tipo b-polio inactivada.

â€” Cuatro meses de edad: La segunda dosis de vacuna conjugada frente Neisseria meningitidis serogrupo C y la segunda dosis de difteria-tÃ©tanos-pertussis-Haemophilus influenzae tipo b-polio inactivada.

â€” Seis meses de edad: La tercera dosis de hepatitis B, la tercera dosis de vacuna conjugada frente Neisseria meningitidis serogrupo C y la tercera dosis de difteria-tÃ©tanospertussis-Haemophilus influenzae tipo b-polio inactivada.

- â€” Quince meses de edad: Se administrará la primera dosis de vacuna triple vÃ­rica, pudiÃ©ndose adelantar a los doce meses para niÃ±os en riesgo.

- â€” Dieciocho meses de edad: Se administrará la cuarta dosis de vacuna de difteria-tÃ©tanos-pertussis-Haemophilus influenzae tipo b-polio inactivada.

â€” Cuatro aÃ±os de edad: Se administrará la quinta dosis de vacuna difteria-tÃ©tanos-pertussis acelular y la segunda dosis de vacuna triple vÃ­rica.

â€” Once aÃ±os de edad: Se administrará tres dosis de hepatitis B en los niÃ±os no vacunados previamente (pauta cero, uno y seis meses).

Actualmente, no es necesaria la revacunaciÃ³n en poblaciÃ³n inmunocompetente, si se han recibido tres dosis de hepatitis B, ni es necesario realizar anticuerpos postvacunales.

- â€” Catorce aÃ±os de edad: Se administrará una dosis de vacuna tÃ©tanos-difteria tipo adulto.

A la entrada en vigor del nuevo calendario, la vacunaciÃ³n frente a la poliomieltis se realizarÃ¡ con vacuna inactivada, independientemente del tipo de vacuna que se haya administrado en dosis anteriores.

- â€” HB: Vacuna tipo infantil frente a la hepatitis B.
- â€” DTP: Vacuna frente a la difteria-tÃ©tanos-pertussis.
- â€” DTPa: Vacuna frente a la difteria-tÃ©tanos-pertussis acelular.
- â€” VPI: Vacuna antipoliomielÃ­tica inactiva trivalente.
- â€” Hib: Vacuna frente al Haemophilus influenzae tipo b.
- â€” Meningococo C: Vacuna conjugada frente Neisseria meningitidis serogrupo C.
- â€” TV: Vacuna triple vÃ­rica (sarampiÃ³n-paperas-rubeola).
- â€” Td: Vacuna tipo adulto frente a tÃ©tanos-difteria.

En caso de duda, consulte con su farmacéutico